

Zorro culpeo (*Lycalopex culpaeus*)

Distribución

Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. En nuestro país a lo largo y ancho de todo Chile, aunque más común en zonas altas cercanas a la Cordillera de los Andes.

Sobre su biología

Se alimenta de ungulados, roedores, liebres, conejos, aves, lagartos, insectos, frutos. Es un importante controlador de liebres en los ecosistemas patagónicos. Tiene hasta 8 crías en primavera.

Amenazas en Chile

Destrucción de hábitat, caza furtiva y perros que lo atacan.

¿Cómo distinguirlo del Zorro chilla?

El Zorro culpeo es de mayor tamaño, cabeza y patas rojizas, vientre, cuello y boca blancos y lomo gris rayado de negro. La cola está muy poblada de pelos grises que se vuelven negros en su punta.

Zorro culpeo y cultura

En tiempos antiguos, algunas tribus fueguinas domesticaron al culpeo, obteniendo el llamado perro yagán.

Relatos pewenches destacan la importancia de "kulpew", como animal tutelar.

El Zorro culpeo en División Andina

El Zorro culpeo puede vivir tranquilo en División Andina, gracias a la prohibición de caza en esta zona. Sin embargo, aún los perros asilvestrados del área podrían estar afectando a esta especie. Si ves un Zorro culpeo no lo molestes, él está controlando plagas como liebres y conejos en los ecosistemas de División Andina.

¡Protejámos al Zorro culpeo y su hábitat!



Tomás Ibarra



Omar Ohrens



Tomás Ibarra

